

ALBARICOQUE

- ✓ Aumento de la producción
- ✓ Maduración temprana e incremento de grados brix
- ✓ Equilibrio vegetativo
- ✓ O muestra carencias de Micro – Elementos
- ✓ Coloración más intensa de las frutas
- ✓ Aumento de la vida útil de las frutas también en la cámara frigorífica
- ✓ Floración más homogénea
- ✓ Mayor resistencia a las enfermedades

| RADICULAR | N. APLICACIONES | DOSIS |
|-----------|---|--|
| GRANULAR | 1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)* | 350 Kg per Ha 350 Kg per Ha |
| COMPLEX | 1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)* | 700 Kg per Ha 700 Kg per Ha |
| PRO | 1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)* | 575 Kg per Ha 575 Kg per Ha |

Ubicar cerca de las raíces de las plantas - enterrar el producto después de la distribución

| FOLIAR | N. APLICACIONES | DOSIS |
|-----------|---|--|
| ULTRAFINE | PRE-FLORECCIÓN (3 APLICACIONES) DURANTE LA FLORACIÓN (1-2 APLICACIONES) POST FLORACIÓN (5-8 APLICACIONES) | 5 Kg per Ha (por ap.) 5 Kg per Ha (por ap.) 3 Kg per Ha (por ap.) |

*No use fertilizantes químicos en el suelo donde se aplica Abomin al suelo, ya que anulará su efectividad