



CÍTRICO

- ✓ Aumento de la producción
- ✓ Maduración temprana e incremento de grados brix
- ✓ Equilibrio vegetativo
- ✓ O muestra carencias de Micro - Elementos
- ✓ Coloración más intensa de las frutas
- ✓ Aumento de la vida útil de las frutas también en la cámara frigorífica
- ✓ Floración más homogénea
- ✓ Mayor resistencia a las enfermedades

RADICULAR	N. APLICACIONES	DOSIS
GRANULAR	1 ^a APLICACIÓN (otoñal)* 2 ^a APLICACIÓN (pre-floración)*	375 Kg per Ha 375 Kg per Ha
COMPLEX	1 ^a APLICACIÓN (otoñal)* 2 ^a APLICACIÓN (pre-floración)*	800 Kg per Ha 800 Kg per Ha
PRO	1 ^a APLICACIÓN (otoñal)* 2 ^a APLICACIÓN (pre-floración)*	650 Kg per Ha 650 Kg per Ha

Ubicar cerca de las raíces de las plantas - enterrar el producto después de la distribución

FOLIAR	N. APLICACIONES	DOSIS
ULTRAFINE	PRE-FLORACIÓN (3 APLICACIONES) DURANTE LA FLORACIÓN (1-2 APLICACIONES) POST FLORACIÓN (5-8 APLICACIONES)	5 Kg per Ha (por ap.) 5 Kg per Ha (por ap.) 3 Kg per Ha (por ap.)

*No use fertilizantes químicos en el suelo donde se aplica Abomin al suelo, ya que anulará su efectividad