



# VID

- ✓ Germinación regular
- ✓ Mayor resistencia a las enfermedades
- ✓ Más rendimiento en mosto
- ✓ Fertilidad de los racimos (sin granos pequeños)

- ✓ Sin alternancia de producción
- ✓ Aumento de compuestos de azufre
- ✓ Aumento de la presencia de metoxipirazina en racimos
- ✓ Mayor resistencia a las enfermedades

RADICULAR	N. APLICACIONES	DOSIS
GRANULAR	1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)*	<b>250</b> Kg per Ha <b>250</b> Kg per Ha
COMPLEX	1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)*	<b>500/600</b> Kg per Ha <b>500/600</b> Kg per Ha
PRO	1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)*	<b>400/500</b> Kg per Ha <b>800/500</b> Kg per Ha

Ubicar cerca de las raíces de las plantas - enterrar el producto después de la distribución

FOLIAR	N. APLICACIONES	DOSIS
ULTRAFINE	PRE-FLORECCIÓN (3 APLICACIONES) DURANTE LA FLORACIÓN (1-2 APLICACIONES) POST FLORACIÓN (5-8 APLICACIONES)	<b>5</b> Kg per Ha (por ap.) <b>5</b> Kg per Ha (por ap.) <b>3</b> Kg per Ha (por ap.)

\*No use fertilizantes químicos en el suelo donde se aplica Abomin al suelo, ya que anulará su efectividad