



# PESCO

- ✓ Assoluta mancanza di carenze
- ✓ Frutti più consistenti e resistenti
- ✓ Shelf life dei frutti aumentata sia su piante che in cella frigo
- ✓ Frutti di colorazione più intensa
- ✓ Maggior resistenza a stress vari
- ✓ Ottimo equilibrio vegeto-produttivo
- ✓ Incremento del grado Brix
- ✓ Fioritura omogenea
- ✓ Maggior resistenza alle malattie

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>400/500</b> Kg per Ha <b>400/500</b> Kg per Ha
COMPLEX	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>800/1000</b> Kg per Ha <b>800/1000</b> Kg per Ha
PRO	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>650/825</b> Kg per Ha <b>650/825</b> Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	PRE FIORITURA (3 APPLICAZIONI) DURANTE LA FIORITURA (1-2 APPLICAZIONI) POST FIORITURA (5-8 APPLICAZIONI)	<b>5</b> Kg per Ha (ad app.) <b>5</b> Kg per Ha (ad app.) <b>3</b> Kg per Ha (ad app.)

\*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.