



# SERRE

- ✓ Correzione di eventuali carenze
- ✓ Inspessimento dei tessuti vegetali
- ✓ Aumento della clorofilla
- ✓ Miglioramento delle caratteristiche organolettiche

- ✓ Miglioramento della colorazione
- ✓ Densità e serbevolezza dei frutti
- ✓ Maggior resistenza alle malattie
- ✓ Aumento del peso specifico dei frutti

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	UNICA APPLICAZIONE (7gg prima del trapianto)*	<b>1400/2000</b> Kg per Ha
COMPLEX	UNICA APPLICAZIONE (7gg prima del trapianto)*	<b>5000</b> Kg per Ha
PRO	UNICA APPLICAZIONE (7gg prima del trapianto)*	<b>5000</b> Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	APPLICARE OGNI 5/7 GIORNI	<b>3/5</b> Kg per Ha (ad app.)

\*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.