



UVA DA VINO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Grappoli omogenei✓ Maggiore resistenza alle malattie✓ Più resa in mosto✓ Fertilità del grappolo (no acinellatura) | <ul style="list-style-type: none">✓ No alternanza di produzione✓ Aumento composti solforati✓ Aumento presenza su grappolo di Metossipirazine✓ Maggior resistenza alle malattie |
|--|---|

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	250 Kg per Ha 250 Kg per Ha
COMPLEX	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	500/600 Kg per Ha 500/600 Kg per Ha
PRO	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	400/500 Kg per Ha 800/500 Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	PRE FIORITURA (3 APPLICAZIONI) DURANTE LA FIORITURA (1-2 APPLICAZIONI) POST FIORITURA (5-8 APPLICAZIONI)	5 Kg per Ha (ad app.) 5 Kg per Ha (ad app.) 3 Kg per Ha (ad app.)

*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.