



# UVA DA TAVOLA

- ✓ Aumento della produttività
- ✓ Aumento del calibro polare ed equatoriale delle bacche
- ✓ Maggior peso medio dei grappoli e omogeneità degli acini
- ✓ Meno lavoro manuale di selezione degli acini
- ✓ Anticipo di maturazione e incremento dei gradi brix
- ✓ Aumento delle resistenze endogene a stress termici
- ✓ Migliore ed anticipata lignificazione dei tralci
- ✓ Miglior possibilità di selezione del legno alla pota
- ✓ Miglior equilibrio vegeto-produttivo del vigneto

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>400</b> Kg per Ha <b>400</b> Kg per Ha
COMPLEX	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>800</b> Kg per Ha <b>800</b> Kg per Ha
PRO	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>650</b> Kg per Ha <b>650</b> Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	PRE FIORITURA (3 APPLICAZIONI) DURANTE LA FIORITURA (1-2 APPLICAZIONI) POST FIORITURA (5-8 APPLICAZIONI)	<b>5</b> Kg per Ha (ad app.) <b>5</b> Kg per Ha (ad app.) <b>3</b> Kg per Ha (ad app.)

\*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.